

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
กรณีบุคลากรเป็น Index case

ชื่อ-สกุลผู้ป่วยสัมผัส

หอผู้ป่วย DX..... U/D.....

สัมผัส Index case จำนวน.....วัน วันที่สัมผัสวันสุดท้าย/...../.....

คำแนะนำ ประเมินเฉพาะผู้ป่วยที่บุคลากรเป็น Index case พุดคุย/ ทำกิจกรรม/หัตถการ/ผ่าตัดเท่านั้น

เกณฑ์ประเมิน	ค่าคะแนน				
1. อาการและอาการแสดงของ Index case	<input type="checkbox"/> ไม่มีอาการแสดง (1) <input type="checkbox"/> มีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ (2) <input type="checkbox"/> มีไข้ ไอ เจ็บคอและอาการระบบทางเดินหายใจ (3)				
2. การใส่ PPE ของ Index case	<input type="checkbox"/> สวม Surgical mask ชั้นในทับด้วยแมสผ้าชั้นนอกหรือสวม N-95 และสวม Face shield (0) <input type="checkbox"/> สวม Surgical mask ชั้นในทับด้วยแมสผ้าชั้นนอกหรือสวม N-95 ตลอดเวลา (1) <input type="checkbox"/> สวมหน้ากากอนามัยชั้นเดียว (2) <input type="checkbox"/> ไม่สวมหน้ากากอนามัย (3)				
3. การทำกิจกรรม/หัตถการ/ผ่าตัดกับ ผู้สัมผัส	<input type="checkbox"/> ไม่ได้พุดคุยหรือทำกิจกรรม/หัตถการ/ผ่าตัด (0)ข้ามไปประเมินข้อ 7 <input type="checkbox"/> ทำกิจกรรมโดยระยะอยู่ห่างตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป (1) <input type="checkbox"/> พุดคุยหรือทำกิจกรรม/หัตถการใกล้ชิดระยะน้อยกว่า 1 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที (2) <input type="checkbox"/> พุดคุยหรือทำกิจกรรม/หัตถการใกล้ชิดระยะน้อยกว่า 1 เมตร เวลาเกิน 5 นาที (3)				
4. ตำแหน่งที่ทำกิจกรรม/หัตถการ/ การผ่าตัดของผู้สัมผัส <i>* กรณีที่ผู้สัมผัสใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ต้องประเมินในข้อนี้</i>	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าระดับเอว (0) <input type="checkbox"/> บริเวณลำตัว (1) <input type="checkbox"/> บริเวณศีรษะ/ทวารร่างกาย + ทำนอนตะแคงหันหลังเข้าหา Index case (2) <input type="checkbox"/> บริเวณศีรษะ /ทวารร่างกาย + ทำนอนหงาย (3)				
5. การใช้ยาสลับในการทำกิจกรรม/ หัตถการ/ผ่าตัด ของผู้สัมผัส	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ทำหัตถการ/ผ่าตัด (0) <input type="checkbox"/> การให้ยาสลับทวารร่างกาย (1) <input type="checkbox"/> การให้ยาสลับเฉพาะส่วน (2) <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับยาสลับ (3)				
6. การหายใจ/ใช้ O ₂ ของผู้สัมผัส	<table border="1"> <tr> <td>กรณีผู้สัมผัสหายใจเอง</td> <td>กรณีใช้ออกซิเจน</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (1) <input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยเป็นครั้งคราว (2) <input type="checkbox"/> ไม่ใส่หน้ากากอนามัย (3) </td> <td> <input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator (0) <input type="checkbox"/> ใช้ O₂ Mask/ O₂ High flow (2) <input type="checkbox"/> ใช้ O₂ canular (3) </td> </tr> </table>	กรณีผู้สัมผัสหายใจเอง	กรณีใช้ออกซิเจน	<input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (1) <input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยเป็นครั้งคราว (2) <input type="checkbox"/> ไม่ใส่หน้ากากอนามัย (3)	<input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator (0) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ Mask/ O ₂ High flow (2) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ canular (3)
กรณีผู้สัมผัสหายใจเอง	กรณีใช้ออกซิเจน				
<input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (1) <input type="checkbox"/> ใส่หน้ากากอนามัยเป็นครั้งคราว (2) <input type="checkbox"/> ไม่ใส่หน้ากากอนามัย (3)	<input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator (0) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ Mask/ O ₂ High flow (2) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ canular (3)				
7. การระบายอากาศภายในห้องผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> ห้องผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ใช้ระบบปรับอากาศ (0) <input type="checkbox"/> ห้องปิด ที่เปิดเครื่องปรับอากาศระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที (1) <input type="checkbox"/> ห้องปิด ที่เปิดเครื่องปรับอากาศระยะเวลามากกว่า 30 นาที (2)				
8. การได้รับวัคซีนของผู้สัมผัส	<input type="checkbox"/> ได้รับวัคซีน 3 เข็ม (0) <input type="checkbox"/> ได้รับวัคซีน 2 เข็ม (1) <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีน 1 เข็ม (2)				
รวมคะแนนความเสี่ยง					

การแปลผลและการดูแลผู้ป่วย

ระดับเสี่ยงต่ำ (≤10 คะแนน)	1. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions 2. ประเมินและสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring)
ระดับเสี่ยงสูง (>10 คะแนน)	1. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง หรือ PUI ในหอผู้ป่วย 2. เฝ้าระวัง 5 วัน และทำ Professional ATK หรือ PCR วันที่ 5 หลังสัมผัส

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
กรณีผู้ป่วยเป็น Index case

ชื่อ-สกุลผู้ป่วยสัมผัส

หอผู้ป่วย DX..... U/D.....
วันที่รับใหม่ /...../.....วันที่สัมผัส Index case...../...../.....

คำแนะนำ ประเมินเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่เตียงติดกันหรืออยู่ในห้องเดียวกันกับผู้ป่วย Index case ในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม aerosol หรือผู้ป่วยที่พูดคุยหรือทำกิจกรรมรวมกันกับผู้ป่วย Index case เท่านั้น

เกณฑ์ประเมิน	ค่าคะแนน	
1. อาการและอาการแสดงของ Index case	<input type="checkbox"/> ไม่มีอาการ อาการแสดง (1) <input type="checkbox"/> มีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ (2) <input type="checkbox"/> มีไข้ ไอ เจ็บคอและอาการระบบทางเดินหายใจ (3)	
2. การใส่ PPE ของ Index case	กรณีผู้สัมผัสหายใจเอง	
	<input type="checkbox"/> สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (1) <input type="checkbox"/> สวมหน้ากากอนามัยเป็นครั้งคราว (2) <input type="checkbox"/> ไม่ใส่หน้ากากอนามัย (3)	
3. กิจกรรมระหว่างผู้ป่วยสัมผัสและ Index case	กรณีใช้ออกซิเจน	
	<input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator with close suction (0) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ canular / O ₂ Mask (1) <input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator with open suction (2) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ High flow/ BIPAP/CPAP ชนิดครอบใบหน้า/ทำกิจกรรม AGP (4)	
4. การหายใจ/ใช้ O ₂ ของผู้สัมผัส	กรณีผู้สัมผัสหายใจเอง	
	<input type="checkbox"/> ไม่ได้พูดคุย หรือพูดคุยกันแต่ระยะห่างระหว่างกันตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป (0) <input type="checkbox"/> พูดคุยหรืออยู่ใกล้ชิดกันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (1) <input type="checkbox"/> พูดคุยหรืออยู่ใกล้ชิดกันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร/ ใช้ระยะเวลาเกิน 5 นาที (3)	กรณีใช้ออกซิเจน
5. การระบายอากาศภายในห้องผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> ใช้ Ventilator (0) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ Mask/ O ₂ High flow (2) <input type="checkbox"/> ใช้ O ₂ canular (3)	
	<input type="checkbox"/> ห้องผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ใช้ระบบปรับอากาศ (0) <input type="checkbox"/> ห้องปิด ที่เปิดเครื่องปรับอากาศระยเวลาน้อยกว่า 30 นาที (1) <input type="checkbox"/> ห้องปิด ที่เปิดเครื่องปรับอากาศระยเวลามากกว่า 30 นาที (2)	
6. การได้รับวัคซีนของผู้สัมผัส	<input type="checkbox"/> ได้รับวัคซีน 3 เข็ม (0) <input type="checkbox"/> ได้รับวัคซีน 2 เข็ม (1) <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีน 1 เข็ม (2)	
รวมคะแนนความเสี่ยง		

การแปลผลและการดูแลผู้ป่วย

ระดับเสี่ยงต่ำ (≤ 7 คะแนน)	1. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions 2. ประเมินและสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring)
ระดับเสี่ยงสูง (>7 คะแนน)	1. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง หรือ PUI ในหอผู้ป่วย 2. เฝ้าระวัง 5 วัน และทำ Professional ATK หรือ PCR วันที่ 5 หลังสัมผัส